

## Übersicht Viszeralonkologischer Studien 2021

Indikation	Kuzname	Behandlung	Therapie
Darm	Circulate	Adjuvant	Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung
	Bering CRC	Palliativ, Beobachtung	Chemotherapie-freie Therapie mit dem BRAF-Inhibitor Encorafenib und dem anti-EGFR Antikörper Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E-mutiertem Kolorektalkarzinom gemäß Fachinformation.
	Arcus	Palliativ	Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von AB928-basierten Behandlungskombinationen bei Patienten mit metastasiertem Darmkrebs
Gallenwege	Acticca	Adjuvant	Adjuvante Chemotherapie mit Gemcitabin und Cisplatin im Vergleich zu Versorgungsstandard nach kurativer Absicht der Resektion des Gallengangskarzinoms und muskelinvasivem Gallenblasenkarzinom
	Incyte	Screening in jedem Stadium, Intervention Palliativ	Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib gegenüber Gemcitabin plus Cisplatin-Chemotherapie bei der Erstlinienbehandlung von Teilnehmern mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit FGFR 2
	Neobil	Neoadjuvant	<i>In Vorbereitung:</i> Neoadjuvantes Bintrafusp alfa bei Patienten mit resektablem Gallengangskarzinom
	MSD- MK 3475	Palliativ	Pembrolizumab Plus Gemcitabin/Cisplatin versus Placebo Plus Gemcitabin/Cisplatin als Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem und/oder inoperablem Gallengang-Karzinom
Ösophagus	Race	Neoadjuvant	Neoadjuvante Radiochemotherapie versus Chemotherapie für Patienten mit lokal fortgeschrittenem, potentiell resektablem Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs (GEJ)
	Hipec-Flot 9	Perioperativ	Präventive HIPEC in Kombination mit perioperativer FLOT versus FLOT allein bei resektablen diffusen Typ Magen- und gastroösophagealer Karzinome und Übergang Typ II/III Adenokarzinom
Leber	ABC-HCC	Palliativ	<i>In Vorbereitung:</i> A Phase IIb, randomized, multicenter, open-label trial of Atezolizumab plus Bevacizumab versus transarterial Chemoembolization (TACE) in intermediate-stage Hepatocellular Carcinoma with high disease burden (MO42851)
	Demand	Palliativ	Studie zur Wirksamkeit von Atezolizumab und Roche Bevacizumab (Atezo/Bev) gefolgt von einer selektiver TACE (sdTACE) bei Erkennung einer Krankheitsprogression
Pankreas	Holipanc	Neoadjuvant	<i>In Vorbereitung:</i> Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität neoadjuvanter Chemotherapie mit liposomalem Irinotecan kombiniert mit 5 Fluorouracil/Folsäure und Oxaliplatin, gefolgt von einer kurativen chirurgischen Resektion bei Patienten mit hepatischem oligometastasiertem Adenokarzinom des Pankreas