

Übersicht Studien Viszeralonkologie 2026

Indikation	Kurzname	Behandlung	Therapie
Gastroösophageal	Hipec-Flot 9	Präventiv Kurativ	Präventive HIPEC in Kombination mit perioperativer FLOT versus FLOT allein bei reresektablen diffusen Typ Magen- und gastroösophagealer Karzinome und Übergang Typ II/III Adenokarzinom.
	HAMMER	Chirurgisch Palliativ	Vollständige Resektion des Primärtumors und Resektion/Ablation aller Metastasen bei metastasierten Adenokarzinomen des distalen Ösophagus und gastroösophagealen Übergangs. Eine monozentrische Pilotstudie.
Pankreas	Holipanc	Neoadjuvant	Chemotherapie aus liposomalem Irinotecan kombiniert mit Oxaliplatin und 5-Fluorouracil/Folinsäure, gefolgt von kurativer Resektion bei Patienten mit auf die Leber beschränktem oligometastatischem Adenokarzinom des Pankreas.
	Metapanc	Neoadjuvant	METAPANC -Intensivierte Behandlung bei Patienten mit oligometastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs - multimodale chirurgische Behandlung gegen-über alleiniger systemischer Chemotherapie: eine randomisierte kontrollierte Studie.
	SPARE	Chirurgisch	Randomisierte Multi-Center Studie zum Vergleich der minimalinvasiven milzresezierenden Pankreaslinksresektion versus der minimalinvasiven milzerhaltenden Pankreaslinksresektion.
	PD-Hydra	Chirurgisch	Perioperative Hydrocortisonbehandlung bei der Pankreatoduodenektomie - randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Interventionsstudie
	TransNiDeG	Chirurgisch	TransNiDeG – Die Wirkung von transkutan appliziertem Nikotin auf die Entwicklung einer Magenentleerungsstörung nach partieller Pankreatoduodenektomie - eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppelblinde multizentrische Studie.
	Pan-Rec-3	Chirurgisch	Randomisierte Single-Center Studie zum Vergleich der Standard-Pankreaskopfresektion versus Pankreaskopfresektion mit der Level-III Dissektion (Pan-Rec-3) via „Artery first approach“ bei primär resektablen Pankreaskarzinom.
Gallenwege	adIVO	Interventionell	Eine Phase-II-Studie zur Erhaltungstherapie mit Ivosidenib nach SOC adjuvanter Chemotherapie bei kurativem intrahepatischem mIDH1-Cholangiokarzinom.
	Pro-Duct 002	Kurativ Transplant	Lebertransplantation zur makroskopischen Tumorfreiheit bei proximalen Gallengangs-Frühschneidungen.
	ARTEMIDE-Biliary02	Palliativ	Phase-III, randomisierte, offene, globale, multizentrische Studie zu Rilvegostomig oder Durvalumab in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskarzinom.
	TRITICC-2	Palliativ	Wirksamkeit und Sicherheit von Trifluridin/Tipiracil in Kombination mit nanoliposomalem Irinotecan als Zweitlinientherapie bei Patienten mit Cholangiokarzinom.
	Clean Duct TRITICC 3	Palliativ	Eine prospektive, einarmige, unverblindete, nicht-randomisierte, multizentrische Phase IIa Pilotstudie zu Durvalumab mit intraduktaler Radiofrequenzablation bei Patienten mit extrahepatischem Gallengangskrebs.
	CARP	Palliativ	Behandlung von Cholangiokarzinomen mit Radiofrequenzablation oder photodynamischer Therapie.
	NISTIPS TRITICC-4	Nicht interventionell	Non-Interventional Study on the Benefits of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunting in Patients with Hepatocellular Carcinoma Receiving Atezolizumab plus Bevacizumab in First-Line Therapy(NISTIPS TRITICC-4, ML46195).
Leber	Ex-Tra	Transplant Kurativ	Multizentrische Studie zur Verkürzung der Wartezeit bis zur Transplantation durch Qualitätsbeurteilung abgelehnter Lebertransplantate mittels ex-vivo Maschinenperfusion
	HOPE4Cancer	Transplant Kurativ	Reduktion des Rezidivrisikos bei Lebertransplantationen aufgrund von hepatozellulären Karzinomen durch Hypothermie Oxygenierte Maschinenperfusion der Transplantat-Leber, randomisierte, kontrollierte, multizentrische, internationale, Phase IV Studie
	HOPE-NMP	Transplant/Kurativ	Multizentrische Studie zur Untersuchung der Auswirkungen der hypothermen (HOPE) oder normothermen (NMP) maschinellen Perfusion im Vergleich zur konventionellen kalten Lagerung auf die Spenderorgane im Rahmen der Lebertransplantation; eine prospektiv randomisierte Studie.
	SMART-MILS	Chirurgisch MPG	Dreidimensionale (3D) Rekonstruktion und Operationsplanung vor minimalinvasiver Leberchirurgie zur Verkürzung der Operationsdauer und Optimierung der intraoperativen Navigation, Surgical Mapping with Advanced 3D-Reconstruction in Minimally Invasive Liver Surgery.
	ABC HCC	Palliativ	Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom.
	ASTrH	Interventionell Onkologisch Radio-onkologisch Chirurgisch	Adjuvante stereotaktische Bestrahlung nach Trans-Arterieller Chemoembolisation bei primär nicht operablen Hepatozellulären Karzinomen.
	ARTEMIDE-HCC01	Palliativ	Offene, für den Sponsor verblindete, randomisierte, kontrollierte, multizentrische Phase-III-Studie mit Rilvegostomig in Kombination mit Bevacizumab mit oder ohne Tremelimumab als Erstlinientherapie bei Patient*innen mit einem fortgeschrittenen hepatozellulären Karzinom ((ARTEMIDE-HCC01)).
	LIVER-R	Nicht interventionell	Multizentrische Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Behandlungsergebnisse von Durvalumab-basierten Therapien bei hepatobiliären Krebserkrankungen unter realen Bedingungen
Ko-lo-rektal	PreReC	Chirurgisch Neoadjuvant	Durchführbarkeit, Compliance und Immunreaktion auf ein intensives trimodales Prähabilitationsprogramm während der neoadjuvanten Behandlung vor einer Rektumkarzinomoperation
Chirurgisch	TATRA	Chirurgisch	Tranexamsäure zur Reduktion des intra- und postoperativen Transfusionsbedarfs in der elektiven Visceralchirurgie: randomisiert-kontrollierte Studie.
	HSI-PCI-2P	Diagnostisch Chirurgisch	Zweiphasige prospektive Beobachtungsstudie zur Identifikation und Validierung hyperspektraler Merkmale peritonealer Tumormanifestationen bei gastrointestinalen und pancreatico-biliären Adenokarzinomen.