

# Aggressive Lymphome

## Diffuses großzelliges B-Zell Lymphom (DLBCL)

**OPTIMAL > 60  
61-80 J  
Phase III**  
optimierte Gabe von Rituximab, Ersatz von konventionellem durch liposomales Vincristin und FDG-PET basierter Therapiereduktion in Kombination mit einer Vitamin-D-Substitution.

**Rezidiv/Refraktäre Lymphome Therapie**

**Nach Transplantation solider Organe**

**PTLD-2  
Phase II**  
Unbehandelte CD20 positive post-transplantationsassoziierte lymphoproliferative Erkrankung (PTLD) nach Transplantation solider Organe

**MOR00208  
Phase II/III**  
Patient nicht fähig für Hoch Dosis Chemo-X und autologe Stem-Zell Transplantation  
MOR00208 + Bendamustin vs Bendamustin + Rituximab

Dr. med. Mareike Tometten  
mtometten@ukaachen.de  
Tel: 0241-8089805

## Primäres ZNS Lymphom (PCNSL)

≤ 70 J

**MATRIX  
Phase III**  
Hochdosis-Chemo-X (mit Methotrexat, Ara-C, Thiotepa, Rituximab) und autologe -ST oder konventionelle Chemotherapie als Konsolidierung bei primären ZNS-Lymphomen

Dr. med. Jens Panse  
jpanse@ukaachen.de  
Tel: 0241-8089805

## Hodgkin Lymphom

**HD 21  
Phase III**  
Erste-Linie Therapie von fortgeschrittenem Stadium  
  
Vergleich von 6 Zyklen mit aufsteigender BEACOPP mit 6 Zyklen mit BrECADD

CLL

Marginalzonen-Lymphom

Mantelzell Lymphom

Register

PD Dr. med Kordelia Zur Hausen  
azurhausen@ukaachen.de  
Tel: 0241-8036367