

Aktuelle Studien der Klinik für Urologie am CIO Aachen

Niere	Prostata	Blase
<p>BMS CA209-653 NIS Nora prospektive Beobachtung zu Nivolumab bei lokal fortgeschrittenem met. Karzinom mit Vorbehandlung</p>	<p>Proteus rand., doppelblind, PhaseIII, Apalutamid bei hochrisiko, lokal fortgeschrittenem Prostata-Ca vor OP, firstline</p>	<p>BMS CA017-078 PhaseIII,neoadjuvante Chemo gegen neoadjuvante Chemo + Nivolumab oder Nivolumab+BMS-986205,+OP mit Nivolumab oder Nivo+BMS-986-205 bei MIBC</p>
<p>MSD 6482-011 rand. PhaseIII, MK-6482 in Kombi mit Levantinib (MK-7902) vs. Cabozantinib als 2. oder 3.Linie bei fortgeschrittenem NCC mit Progress bei vorheriger AntiPD-1/L1 Therapie</p>	<p>MSD 3475-641 Phase III, rand, doppelblind, Pembrolizumab + Enzalutamide gegen Placebo + Enzalutamide bei mCRPC</p>	
<p>BMS CA 209-914 rand.Phase III, Nivolumab + Ipilimumab vs Nivolumab+ Placebo vs Placebo bei high risk NCC nach OP</p>	<p>PCO-Study "Prostate Cancer Outcomes-Compare& Reduce Variation"</p>	